

Aus der Frauenklinik der Universität Bonn
Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. v. Franqu é.

DOPPELTES PROMONTORIUM.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung

der

DOKTORWÜRDE

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn

Vorgelegt am 9. Juni 1934

von

Albert Josef Sommer

prakt. Arzt

aus Anröchte i. W.



Bonn 1936

Buchdruckerei KUBENS Nachflg., Maxstr. 75.

Gedruckt mit Genehmigung
der mediz. Fakultät der Universität Bonn

Referent : Prof. Dr. v. Franqué



Weit größere Bedeutung als die innere Untersuchung des weichen Geburtsweges hat für die Geburtsprognose die Untersuchung des knöchernen Beckens, die einerseits in der äußeren und inneren Messung, andererseits in der Austastung des Beckens besteht. Diese kombinierte Untersuchung ermöglicht, den allgemeinen Charakter des Beckens sowie ein oder auch mehrere Maße der Beckenhöhle festzustellen und somit einen Schluß auf die Weite des kleinen Beckens, also auch auf den Geburtsverlauf, zu ziehen. Für die mannigfaltigen Arten der knöchernen Becken — wie allgemein zu weites und enges Becken usw. — dienen verschiedene anatomische Stützpunkte, deren Messungen mittels Beckenmessers, auch Tasterzirkel genannt, Möglichkeit geben, vor allem die Quantität des Beckens zu bestimmen, um z. B. die nur mit großer Unsicherheit festzustellende Größe des Kindskopfes dem für den Geburtsverlauf sehr wichtigen zweiten Faktor „Becken“ gegenüberzustellen und die Wahrscheinlichkeit einer normalen oder anormalen Geburt vorherzufagen.

Praktisch wichtig ist für die Beckenmessung das Maß des kürzesten Weges, d. h. die Entfernung vom unteren Rande der Symphyse zum Promontorium oder Vorsprung des unteren Lendenwirbels. Diese direkte Entfernung = Conjugata diagonalis beträgt normaliter $12\frac{1}{2}$ — $13\frac{1}{2}$ = 13 cm. Um aus der Conjugata diagonalis die Vera zu berechnen, muß man im Durchschnitt $1\frac{1}{2}$ —2 cm = 1,75 cm abziehen. Der Abzug muß umso größer ausfallen, je höher die Symphyse und je stumpfer der Winkel ist, den die Symphyse mit der Vera bildet, also auch je höher das Promontorium zur Symphyse steht, schließlich je stärker der Symphyfenknorpel vorspringt.

Dem untersuchenden Arzt begegnet häufiger ein weit geringeres Maß als die normale Conjugata diagonalis. Handelt

es sich nun um einen Untersuchungsfehler oder um pathologische Veränderungen? Bekannt sind Tumoren im Sinne von Exostosen und ähnliche Erscheinungen, deren Einzelheiten hier zu erwähnen zu weit führen würde.

Nach B u m m kommt am häufigsten beim einfach platten Becken infolge übermäßiger Belastung des Kreuzbeines durch schwere anhaltende Arbeit ein abnormes Tiefertreten zwischen den Darmbeinen vor, wobei unterhalb des wahren Promontoriums an der Verbindungsstelle zwischen 1. und 2. Kreuzbeinwirbel ein zweiter Vorberg = falsches oder auch doppeltes Promontorium entsteht, das oft der Schoßfuge näherliegt und somit für die Bestimmung der Weite des Eingangs wichtig ist. Durch dieses Tiefertreten des Kreuzbeines tritt selbstverständlich auch eine vermehrte Querspannung des Beckenringes auf. Beim biskuit- bzw. auch kartenherzförmigen rachitischen Becken ist das Promontorium der Symphyse genähert, die Conjugata vera, d. h. die Verbindungslinie vom hinteren Rand der Symphyse zum Promontorium verengt. Wenn nun auch Verdickungen der evtl. vorhandenen Symphyseknorpel, die an der hinteren Grenze der Schamfuge Prominenzen bilden und den geraden Durchmesser des Beckeneinganges wesentlich verkleinern, so ist doch die Querspannung des Beckeneinganges vergrößert. Die Kreuzbeinwirbel treten in der Kreuzbeinaushöhlung nicht zurück, d. h. soweit wie beim normalen Becken, so daß die schöne Aushöhlung des Kreuzbeines verschwindet und es sogar zu einer konvexen Hervorragung der Wirbelkörper in das Lumen der Beckenmitte führt. Häufiger tritt auch der erste Kreuzbeinwirbel noch hervor, sodaß er mit dem zweiten gleich zurücktretenden eine hervorragende Leiste bildet, die ein zweites gleich doppeltes Promontorium darstellt. Fritsch bezeichnet das falsche Promontorium als eine Fuge zwischen den beiden obersten Kreuzbeinwirbeln, K n a p p schreibt in seiner Propädeutik von einem auffallend starken Hervortreten der Zwischenwirbelbandscheiben der unterhalb

des eigentlichen Promontoriums gelegenen Kreuzbeinwirbel gegen den Raum des kleinen Beckens und nennt es falsches Promontorium. Nach Waldeyer ist jede Erhöhung, die unterhalb des eigentlichen Promontorium liegt — also unterhalb der Stelle, wo der unterste Lendenwirbel auf den ersten Kreuzbeinwirbel stößt — ein doppeltes Promontorium.

Wir finden Untersuchungen von Breuß und Kolisko, nach denen bei falschen Promontorien sowohl Verlängerung als auch Verkürzung des Kreuzbeines vorkommen, je nachdem das Kreuzbein aus 4 oder 6 Wirbelkörpern besteht. Es treten dementsprechend Übergangsformen des 5. Lumbal mit dem 1. oder 2. Sacralwirbel auf. Dadurch ist die Stellung des Kreuzbeines zwischen den Darmbeinen fast immer eine regelwidrige in Bezug auf das Verhältnis des Promontoriums zur Terminalebene sowohl als auch hinsichtlich der Neigung des Kreuzbeines zwischen den Leistenbeckenknochen. Bei Tiefstand des Promontoriums, also auch beim doppelten Promontorium, fanden Breuß und Kolisko die Stellung der Darmbeinplatten auffallend steil, in anderen Fällen auch flach gelegt. Betreffend Geräumigkeitsverhältnisse waren bei Hochstand des Promontoriums die geraden Durchmesser verkürzt, die queren Durchmesser des Eingangs und der Mitte etwas vermindert. Umgekehrt war bei Tiefstand des Promontoriums meist eine normale oder etwas verringerte Länge der Conjugata vera und bei 4wirbeligen Sacrum eine Verlängerung des Sagittaldurchmessers im Ausgang erkennbar.

Obwohl auch heute noch alle Resultate der inneren Beckenmessung trotz modernster Instrumente wie „Hütchen von Boivin“, „Katheter von Matei“, „Zirkel von Hüvel“ oder das erst im Jahre 1931 erfundene Instrument von Wolf mathematisch ungenau sind und einen subjektiven Stempel tragen, so ist auch dieser relative Wert für den Geburtsverlauf doch immerhin wichtig.

In jüngster Zeit erscheinen Arbeiten über Beckenmessungen, die sich auf Röntgen-Untersuchungen stützen (Saidl,

Guthmann). Allgemein ist die Pathologie des Beckens, z. B. des Assimilationsbeckens an der Hand von Röntgenbildern genauer studiert worden und auch Fälle von doppelten Promontorien röntgenologisch festgestellt worden.

Wir gehen nunmehr zur Besprechung der an der Bonner Geburtshilflichen Gynäkologischen Klinik vorgekommenen Fälle von doppeltem Promontorium über. Unsere Betrachtung umfaßt die Fälle vom 1. Juni 1931 bis zum 1. Juni 1934, wobei erwähnt sei, daß nur die Fälle, die durch seitliche Röntgenaufnahmen sich als einwandfrei beweisen, wiedergegeben werden können. Ihre Raumverhältnisse zum Becken mit den darauffolgenden Geburtsverläufen kennen zu lernen, soll im folgenden die Aufgabe sein.

Fall I.

Frau Elisabeth V., 21 Jahre, Ipara.

Aufnahme 10. 11. 31.

Anamnese: Familie o. B. Laufenlernen mit 4 Jahren, nie krank gewesen. Erste Regel mit 16 Jahren alle 28 Tage, 3—4 Tage lang, starker Blutverlust, viel Rückenschmerzen, keine Fehlgeburten. Letzte Regel vom 23. 1. 31. bis 26. 1. 31. Erste Kindsbewegung im 5. Monat. Während der Schwangerschaft keine Beschwerden gehabt.

Status praesens: Kleine Frau in ausreichendem Ernährungszustand, deutliche Zeichen von Rachitis an beiden Unterschenkeln, rachitischer Rosenkranz, rachitische Zähne, Skoliose der Lendenwirbelsäule. Spitzbauch mit schlaffen Bauchdecken und starker Venenzeichnung. Nabel verstrichen, größter Leibesumfang 110 cm. Gebärmutter steht am Rippenbogen, größere Resistenz links, kleine Teile rechts. Herztöne links unterhalb des Nabels zu hören. Der Kopf ist dem Becken aufgepreßt, überragt fast querfingerbreit die Symphyse und ist leicht nach rechts abgewichen. Blase ist gesprungen, gute Wehen. Röntgenaufnahme zeigt eine Conjugata vera von 8,2 cm, einen queren Durchmesser von

14 cm. Der erste Kreuzbeinwirbel springt verhältnismäßig weit hervor, sein unterer Rand ist als falsches Promontorium gut zu erkennen. Wir haben ein platt rachitisches Becken, Verengung 2. Grades und ein doppeltes Promontorium vor uns; der 9,6 cm große quere Kopfdurchmesser kann den Naturweg nicht gehen und es wird deshalb die Sectio caefarea transperitonealis cervicalis beschlossen.

Lokalanästhesie: Eine Viertelstunde später Längsschnitt in der Mittellinie. Eröffnung der Bauchhöhle. Abstecken der Därme. Dann Infiltration des Peritonealüberzuges mit Novocainlösung. Das Peritoneum wird in diesem Bereiche quer durchtrennt und die Blase nach unten abgeschoben. Längseröffnung des Uterus im unteren Drittel. Entwicklung des Kindes, das lebensfrisch ist, mit der Zange. Uterus ist gut kontrahiert. Die Placenta wird manuell gelöst, der Uterus mit Knopfnähten und zwei fortlaufenden Nähten geschlossen. — Das rechte Schädelbein des Kindes ist über das linke geschoben. Die Länge beträgt 52 cm, Gew. 4000 gr. — Mutter und Kind werden gesund entlassen.

Fall II.

Frau Anna W., 37 Jahre alt, I para.

Beginn der Wehen am 31. 10. 1932, am 21. 11. 32 in die Klinik aufgenommen.

Anamnese: Eltern, Geschwister und Mann sind gesund. Spät laufen gelernt. Erste Regel mit 16 Jahren, alle 28 Tage, 4—5 Tage lang, Blutverlust gering. Letzte Regel Ende Januar 32. Auswärts zweimal vaginal untersucht.

Status praesens: Kleine grazile Frau, keine Oedeme, keine Varizen, keine äußeren Zeichen von Rachitis. Eiweiß positiv, im Sediment vereinzelt Leukocyten, reichlich Erythrocyten und hyaline Zylinder. Größter Leibesumfang 90 cm. Wassermann: negativ, Bauchdecken mäßig straff. Fundus uteri steht 1 Querfinger unterhalb des Rippenbogens. Herztöne sind links unterhalb des Nabels gut zu hören,

Kindsbewegungen wahrnehmbar. Der Rücken liegt links, kleine Teile rechts, Kopf über dem Becken beweglich.

16.30: kräftige Wehen alle 3—4 Minuten, der Kopf immer noch beweglich über dem Becken.

Distantia spinarum 23,5 cm.

Distantia cristarum 25,5 cm.

Conjugata externa 17,5 cm.

Diagnose: Graviditas X. mens I para, erste Schädel-lage.

Rectal-Untersuchung: Muttermund handteller-groß, Fontanellen nicht zu fühlen, Kopf abdrückbar, Promontorium zu erreichen. Es werden zwei Röntgenaufnahmen gemacht: Sitzaufnahme mißt eine Conjugata vera von 9 cm, seitliche Röntgenaufnahme eine Conjugata vera von 9,2 cm. Der quere Durchmesser beträgt 13,2 cm. Das obere Drittel des 1. Kreuzbeinwirbels springt weiter als normal der Fall ist als 2. Promontorium vor. Zur obigen Diagnose kommt nun noch Beckenverengung 1. Grades und doppeltes Promontorium.

17.50: Bei abermaliger rectaler Untersuchung springt die Blase.

Pfeilnaht verläuft von links hinten nach rechts vorne. Walcher'sche Hängelage wird angeordnet.

19.: Status idem. Der Kopf ist auch nicht eine Spur vorwärts gerückt. Anschließend Sectio caesarea transperitonealis.

19.45: Geburt eines ausgetragenen Mädchens mit Konfiguration beider Scheitelbeine über Stirnbeine. Länge 50 cm. Gew. 3350 gr. Großer puerer Kopfdurchmesser 9,2 cm.

Mutter und Kind gesund entlassen.

Fall III.

Frau Maria G., 26 Jahre alt, para I.

Anamnese: Gravida wird mit mäßigen Wehen am 14. 2. 1933 aufgenommen. Vater gestorben an unbekannter Ur-

fache. Laufen gelernt mit 3 Jahren, außer Mäfern als Kind englische Krankheit gehabt, keine Fehlgeburten durchgemacht. Erste Regel mit 19 Jahren, regelmäßig 4—5 Tage anhaltend, mit sehr starken Blutverlusten.

Status praesens: Frau von 148 cm Größe, in mittlerem Ernährungszustand, typischer rachitischer Rosenkranz, straffe Bauchdecken, Nabel verstrichen. Blutdruck = R.R. 125/80 mmHg, größter Leibesumfang 98 cm, Gebärmuttergrund 1 Querfinger breit unterhalb des Rippenbogens, größere Resistenz links, kleinere Teile rechts oben im Fundus, führend steht leicht ballotierend über dem Becken der Kopf. Die Blase ist inzwischen gesprungen und es läuft Fruchtwasser ab. Kindliche Herztöne gut.

Dist. spin. 25,5 cm.

Dist. crist. 27 cm.

Conjugata externa 16 cm.

Conjugata vera nach Röntgen 8,1 cm.

Außerdem zeigt die Aufnahme den 1. Sacralwirbel mäßig vorspringend und in der Mitte desselben einen Auswuchs = falsches Promontorium. Die mäßigen Wehen haben nachgelassen und hören nach $\frac{1}{2}$ Stunde vollständig auf. Wegen Beckenverengerung 2. Grades und doppeltem Promontorium liegt, zumal dringend ein lebendes Kind gewünscht wird, die Blase erst vor 4 Stunden gesprungen ist und Pat. fieberfrei ist, Indikation zur Sectio vor. Hinzu kommt jetzt noch, daß die kindlichen Herztöne zeitweise unter 100 sind. Drohende Asphyxie und Abwarten stellen die Möglichkeit, ein lebendes Kind zu bekommen, ziemlich sicher in Frage. Es wird zur Sectio vorbereitet. Kurz vor Beginn der Operation sind die kindlichen Herztöne nur noch 80. Durch transperitoneale Schnittentbindung wird $\frac{1}{2}$ Stunde später ein blau asphyktischer lebender Knabe zur Welt gebracht, dessen großer querer Kopfdurchmesser 9,1 cm beträgt. Konfiguration: beide Scheitelbeine über Stirn- und Hinter-Hauptbeine. Revision des Beckens bestätigt ein doppeltes Promon-

torium und eine Conjugata vera von 8,1 cm (Holzstäbchenmessung).

Wegen Bronchopneumonia dextra und leichter Thrombophlebitis der Beckenvenen mußte Pat. 14 Tage länger als gewöhnlich in der Klinik verbleiben, konnte aber dann mit Kind gesund entlassen werden.

Fall IV.

Fräulein Käthe E., 25 Jahre, I para.

Aufnahme: 8. 10. 33.

Anamnese: Pat. lernte mit 4 Jahren Laufen, als Kind Mafern, Scharlach und englische Krankheit gehabt, erste Regel mit 14 Jahren, alle 28 Tage, 5—8 Tage lang, starker Blutverlust, viele Rückenschmerzen, keine Fehlgeburten. Letzte Regel vom 4. 1. 33. bis 8. 1. 33. Während der Schwangerschaft keine Beschwerden gehabt. Errechenbarer Geburtszeitpunkt 11. 10. 33.

Status praesens: Kleine Frau, rachitischer Habitus, rachitischer Rosenkranz, rachitische Beine. Keine Oedeme, keine Varizen. Bauchdecken sind straff, Nabel verstrichen, größter Leibesumfang 88 cm, Brüste o. B. Gebärmutter steht unter dem rechten Rippenbogen, eine größere Resistenz links, kleine Teile rechts. Vorliegender Teil ist der Kopf, Kindsbewegungen deutlich wahrnehmbar, Herztöne links und median unterhalb des Nabels. Leichte Trübung von Eiweiß. Beckenmaße:

Dist. spin. 26,5 cm.

Dist. crist. 27 cm.

Conjugata ext. 16 cm.

Röntgenaufnahme ergibt eine Conj. vera von 8,3 cm. Der I. Sacralwirbel ragt im obersten Drittel vorspringend in das Beckenvolumen als doppeltes Promontorium. Rectal ist das Promontorium leicht zu fassen, Portio noch erhalten, Muttermund für einen Finger durchgängig. Kopf ragt über Symphyse etwas vor.

Diagnose: Graviditas X. mens, Schädellage, Beckenverengerung 2. Grades (platt rachitisches Becken) und doppeltes Promontorium. Trotzdem Stunden mit sehr guten Wehen vergehen, kommt der Kopf nicht tiefer. Das Mißverhältnis des Beckens zwingt zur Sectio caesarea, wobei sich mit der Zange ein kräftiges und gefundes Kind entwickeln läßt. Der große quere Kopfdurchmesser beträgt 8,3 cm. Geschlecht männlich, Länge 49 cm, Gewicht 3150 gr. Beide werden gesund entlassen.

Fall V.

Frau Barbara H., 34 Jahre, IV. para.

Am 3. 12. 33 vormittags Wehen und gegen Mittag plötzlich sehr starke Schmerzen im Unterleib. Ab dieser Zeit regelmäßig alle 5—6 Stunden heftiges Erbrechen. Pat. wird vom behandelnden Arzt zwecks Sectio caesarea am 6. 12. der Klinik überwiesen.

Anamnese: Erste Menfes mit 14 Jahren, alle 28 Tage, 2—3 Tage lang, normaler Blutverlust, keine Beschwerden, keine Fehlgeburten, frühere Entbindungen: drei. Im März 1921 Symphysiotomie in der Frauenklinik zu Köln = lebender Knabe. November 1925 Sectio caesarea = lebender Knabe. November 1928 Spontangeburt des dritten, aber sehr kleinen Knaben, der ebenfalls lebt. Die beiden letzten Entbindungen haben im Kreiskrankenhaus zu Prüm stattgefunden. Jetzige letzte Regel 24. 3. bis 27. 3. 33. In den ersten 4 Monaten Erbrechen und Sodbrennen. Erste Kindsbewegungen ab 12. 8. 33. Errechenbarer Geburtszeitpunkt 31. 12. 33. Draußen zweimal vaginal untersucht.

14.09 Status praesens: Kleine Frau in bedürftigem Ernährungszustand, Schleimhäute mäßig durchblutet, keine Varizen, keine Oedeme. Bauchdecken straff und gespannt, Nabel verstrichen. Größter Leibesumfang 90,5 cm. Brüste infantil, Warzen faßbar. Stand des Gebärmutterbogens am Rippenbogen, kleine Teile rechts unten im Fundus fühlbar.

Eine größere Resistenz links, überall Aortengeräusche, kindliche Herztöne nicht zu hören, Kindesbewegungen nicht sicher wahrnehmbar. Temperatur: 37,4°, Puls 124 und sehr klein.

Dist. spin. 24,5 cm.

Dist. crist. 26,5 cm.

Conj. externa 15,5 cm.

Diagnose: Graviditas X. mens, IV. para, Lage?

14.30: Innere Untersuchung: Portio noch erhalten, für 1 Finger durchgängig, Kopf erst ganz in der Höhe erreichbar. Promontorium sehr leicht abzutasten. Röntgenaufnahme 15/40. Kopf steht hoch über dem Becken. Auf dem Röntgenbilde im untersten Drittel des 5. Lumbalwirbels ein zweiter Vorsprung oder falsches Promontorium gut erkennbar. Die Conjugata vera beträgt 7,4 cm. Eine frühere Messung nach Bilicky hatte eine Conjugata diagonalis von 9,1 cm ergeben.

Bei der jetzt einwandfreien Diagnose: Schädellage, Beckenveränderung 3. Grades und doppeltes Promontorium liegt, besonders noch durch die Anamnese gestärkt, Verdacht einer Uterusruptur vor.

17.40: Laparotomie mit anschließender Uterusexstirpation. Nach Eröffnung der Bauchhöhle Blutgerinnsel und frisches Blut in derselben, Frucht im geschlossenen Eihautsack frei in der Bauchhöhle liegend. Vollständige Querruptur im Fundus uteri. Geburt eines nichtausgetragenen toten Mädchens aus Schädellage. Der große quere Kopfdurchmesser mißt 8,8 cm, Länge 49 cm, Gewicht 3100 gr. — Promontorium als doppeltes stark vorspringend im unteren Drittel des Lendenwirbels, Stäbchenmessung ergibt eine Conjugata vera von 7,5 cm. — Pat. bekommt am 9. 12. eine rechtsseitige Pneumonie, Temperatur: 38,6, Puls beschleunigt, Abdomen weich. Am 12. 12. sehr beschleunigte Atmung, stark gerötetes Gesicht, sehr kleiner Puls, Abdomen immer noch weich, abends Exitus letalis. Obduktionsbefund: Abdomen und Operations-

gebiet o. B. Tod infolge konfluierender Bronchopneumonie.

Fall VI.

Frau Therefe Pr., 44 Jahre, VIII. para.

Aufnahme: 2. I. 34.

Anamnese: Vater und eine Schwester an Tbc. gestorben, verheiratet seit 1914, mit $\frac{3}{4}$ Jahren Laufen gelernt, 1924 anschließend im Wochenbett an Lungenentzündung erkrankt gewesen. Erste Regel mit 18 Jahren, Regelblutung alle 28 Tage, 5—6 Tage lang, starker Blutverlust. Von 7 Entbindungen 6mal spontan geboren, einmal mußte Forceps gemacht werden. Alle Kinder leben und sind gesund. Fehlgeburten haben nicht stattgefunden. Letzte Regel vom 27. 3. bis 2. 4. 33. Errechenbarer Geburtszeitpunkt 3. I. 34. Verlauf der jetzigen Schwangerschaft ohne Beschwerden.

Status praesens: Äußere Untersuchung: Mittelgroße Pat. in gutem Ernährungszustand, keine sichtbare rachitischen Zeichen. Keine Oedeme. Herz und Lungen gesund. Kein Eiweiß. Bauchdecken mäßig straff, Nabel nicht verstrichen. Größter Leibesumfang 117 cm. Brüste o. B. Gebärmuttergrund am Rippenbogen. Größere Resistenz rechts, kleine wahrnehmbar. Mäßige Wehen alle 3—4 Min., Temperatur 36,4, Puls.

Dist. spin. 27 cm

Dist. crist. 29 cm

Conj. ext. 20,5 cm.

Diagnose: X. mens., VIII. para, Schädellage.

Nach 18 Stunden hören die Wehen auf und Pat. steht auf. 4 Tage muß sie wieder in den Kreißaal aufgenommen werden. Die Wehen haben langsam wieder eingesetzt und kommen jetzt durchschnittlich alle 4 Min. Die Blase ist gesprungen und der Kopf beweglich über dem Becken.

Innere Untersuchung: Der Kopf ist eben zu erreichen, Muttermund ist vollständig erweitert. Pfeilnaht verläuft im pueren Durchmesser. Der Kontraktionsring steht etwa zwei

Finger unterhalb des Nabels. 2 Stunden später steht derselbe etwas über dem Nabel, das untere Uterinsegment ist jedoch nicht schmerzhaft. Eine nochmalige rektale Unterluchung zeigt kein Vordrängen des Koptes. Herztöne 172, Puls der Mutter über 120.

Röntgenaufnahme: Kopt steht oberhalb des Beckeneingangs, ancheinend im hohen Schräglstand. Es ist sehr stark kontiguiert. Vorne ist zwischen Kopt und Symphyse noch sehr viel Zwischenraum. Hinten sitzt der Kopt im oberen Drittel des 1. Sacralwirbels — einem fälligen Promontorium auf. Die Conjugata vera mißt 9,4 cm.

Vaginale Unterluchung: Muttermund verstrichen. Der Kopt mit kleinstem Segment teilt dem Becken aufgespreßt. Die kleine Fontanelle ist rechts festlich, die große etwas rechts von der Mittellinie, die Pielthaut ganz nahe dem Promontorium, und zwar dem obersten Vor sprung. Mehrfacher Versuch, den Kopt einzupressen, mißlingt; er tritt nicht tiefer. Da nun das untere Uterinsegment stark ausgerogen ist, so ist die Geburtsbeendigung angereizt. Es wird der Schamfugenschnitt beschlossen.

Nach Desinfektion Eingehen mit der linken Hand, Zeigefinger hinter der Schamfuge drängt die Urethra nach links, der Daumen drückt von außen die Clitoris ebenfalls nach links. Einstecken mit einem spitzen Meßler. Nach vorsichtigem Durchschneiden der Mitte des Knorpels wird ein geknöpfes Meßler eingeführt, und erst nach oben, dann nach unten einschneidend Ligamentum der Knorpel durchtrennt. Die Schamfuge klappt schon etwa 1 Querfinger breit auseinander. Der Kopt wird von außen eingedrückt und mit der Zange leicht im ersten schrägen Durchmesser gefaßt, spielend tiefer gezogen unter Drehung im Sinne des Uhrzeigers. Der Kopt ist jetzt auf dem Beckenboden, die kleine Fontanelle vorn, die Löffel stehen im zweiten schrägen Durchmesser. Nach Lutten der Zangelöffel werden dieselben etwas zurück geschoben, so daß sie im queren Durchmesser stehen. Nun

wird der Kopf nach Art der Hinterhauptlage entwickelt und ein lebender Knabe mit 10,2 cm großem queren Kopfdurchmesser geboren. Das rechte Scheitellbein liegt unter dem linken. Auf den beiden vorderen Dritteln des linken Scheitellbeines befindet sich eine starke Kopfgeschwulst. Länge 50 cm, Gewicht 3160 gr. — Mutter und Kind werden gesund entlassen.

Fall VII.

Frau Maria K., 32 Jahre, II. para.

Aufnahme 21. 3. 34.

Gegen 4 Uhr morgens die ersten Wehen.

Anamnese: Vater gesund, Mutter im Wochenbett gestorben. 5 Kinder leben und sind gesund. Pat. hat Laufen gelernt mit 3 Jahren, als Kind englische Krankheit gehabt. Erste Regel mit 16 Jahren, alle 28 Tage, 2—4 Tage lang, Blutverlust normal.

Am 4. 1. 1927 in hiesiger Klinik wegen rachitisch engem Becken mit Entbindung eines lebenden und gesunden Knaben, der allerdings 6 Wochen später an Krämpfen gestorben ist. Letzte Regel vom 16. 6.—20. 6. 33. Erste Kindsbewegung 17. 10. 33, in letzter Zeit viel an Kreuzschmerzen gelitten.

Status praesens: mittelgroßer Pat., guter Allgemeinzustand, keine Oedeme, rachitischer Rosenkranz. Gebärmutter steht 3 Querfinger breit unterhalb des Rippenbogens, größte Resistenz links, kleine Teile rech. Vorliegender Teil ist der Kopf. Kindsbewegungen deutlich wahrnehmbar. Temperatur 36,8, Puls 96.

Dist. spin. 26 cm.

Dist. crist. 29 cm.

Conj. ext. 17,5 cm.

Röntgenaufnahme: Der 5. Lumbalwirbel erweist sich am unteren Drittel, weit vorspringend in das Becken als falscher oder zweiter Vorberg. Conjugata vera 7,1 cm.

Diagnose: Graviditas X. mens., II. para, erste Schädel-
dellage, Beckenverengung 3. Grades.

16.30: Der Kopf ist beweglich über dem Becken, die Blase steht, alle 2—3 Min. leichte Wehen.

17.30: plötzlich sehr starke Wehen alle 2 Min. Da die Geburt per vias naturales nicht möglich, wird zur Sectio caesarea vorbereitet.

18.40: Geburt eines ausgetragenen, reifen und lebensfrischen Knaben aus Schräglage durch Sectio caesarea transperiotenalis. Im Becken ist das doppelte Promontorium gut fühlbar, die Holzstäbchenmessung ergibt eine Conjugata vera von 7,4 cm. Der große quere Kopfdurchmesser des Kindes beträgt 8,5 cm, die Länge 49 cm, das Gewicht 3200 gr. Am 18. 4. 34 werden Mutter und Kind gesund aus der Klinik entlassen.

Fall VIII.


Frau Maria V., 34 Jahre alt, II. para.

Aufnahme: 5. 3. 34.

Anamnese: Mutter starb im Wochenbett, Vater und Geschwister sind gesund. Verheiratet seit 1926. Früher an Gelenkrheumatismus erkrankt gewesen. Erste Regel mit 17 Jahren unregelmäßig, durchschnittlich alle 2—4 Wochen, keine Fehlgeburten durchgemacht. Am 23. 3. 1928 wegen Beckenverengung 1. Grades und angeblichen Exostosen neben dem Promontorium Schnittentbindung in hiesiger Klinik. Das Kind, ein gesunder Knabe, lebt. Jetzige letzte Regel vom 27. 8.—1. 9. 1933. Erste Kindsbewegungen Mitte Dezember wahrgenommen. Errechenbarer Geburtszeitpunkt 3 6. 34. Seitens der Schwangerschaft bisher keine Beschwerden gehabt.

Status praesens: Große Pat. in gutem Ernährungszustand, Varizen am linken Unterschenkel. Keine Oedeme, keine sichtbaren Zeichen von Rachitis.

Herz: Systolisches Geräusch über allen Ostien-Mitralinsuffizienz. Die Bauchdecken sind mäßig straff. Nabel verstrichen, größter Leibesumfang 97 cm. Am 11. 5. 34 gegen 14 Uhr



plötzlich heftige Wehen. Der Fundus uteri steht 3 Querfinger oberhalb des Nabels, größere Resistenz links, kleine Teile rechts. Kindbewegungen deutlich wahrnehmbar.

Dist. spin. 25 cm.

Dist. crist. 28,5 cm.

Conj. ext. 19 cm.

Befund nach Röntgenaufnahme: Der 5. Lumbalwirbel springt im oberen und unteren Drittel besonders stark in das Lumen des Beckens hervor. Beiliegendes Bild im Maßstabe natürlich verkleinert, gibt den in Frage kommenden genauen Umriß der Aufnahme wieder. Greifen wir die beiden der Symphyse am nächsten liegenden Punkte heraus, so bekommen wir zwei Engen, die der kindliche Schädel passieren muß, und zwar eine obere oder erste von 9,4 cm und eine untere oder zweite von 9,2 cm. Das wahre Promontorium besteht dementsprechend aus zwei Vorbergen, so daß man den untersten Vorprung des 5. Lumbalwirbels als zweites bzw. doppeltes Promontorium bezeichnen muß.

Da der errechenbare Geburtszeitpunkt nach dem 1. Juli fällt, so habe ich als Geburtsverlauf den Verlauf der ersten Niederkunft von 1928 in der allgemeinen Zusammenstellung der Fälle angegeben.

Der besseren Übersicht wegen sind die gemeinsamen Momente vorstehender Fälle in den beiden nachstehenden Tabellen kurz zusammengefaßt. Tabelle I betrifft die Mutter, Tabelle II das Kind. Es ergibt sich folgendes: Von Juni 1931 bis Juni 1934, also in den letzten drei Jahren, kommen 8 durch seitliche Röntgenaufnahmen nachweisbare doppelte Promontorien vor. Die Zahl der Geburten beträgt in dieser Zeit annähernd 2000. Von den 8 falschen Promontorien haben 5, also die Mehrzahl, ihren Sitz im oberen Drittel des 1. Sacralwirbels, die anderen 3 im unteren Drittel des 5. Lumbalwirbels. Von den 8 Gravidae sind 4 primiparae = die Hälfte oder 50%. Die anderen 4 sind pluriparae, und zwar 2 = II parae, 1 = 4 parae, 1 = 8 parae. Von den Multi-

parae sind zwei früher durch Kunsthilfe (in beiden Fällen Sectio) entbunden worden. Die restlichen zwei dagegen haben neben der Kunsthilfe auch spontan geboren. Die älteste Gravida ist 44 Jahre und die jüngste 21 Jahre alt. In allen 8 Fällen liegen Beckenverengerungen, und zwar

in 3 solche 1. Grades

in 3 solche 2. Grades

in 2 solche 3. Grades vor.

Bei 50% = 4 Frauen finden sich deutlich sichtbare Zeichen von Rachitis (rachitischer Rosenkranz, rachitische Zähne, rachitische Veränderungen der Unterschenkel). Fall I weist außerdem noch eine Skoliose der unteren Lendenwirbelsäule auf. Die größte röntgenologische Messung der Conjugata vera ist 9,4 cm, die kleinste 7,1 cm. In 4 Fällen kann der Blasensprung vor der Kunsthilfe nachgewiesen werden. Die größte Zeitspanne beträgt dabei 4 Stunden und die kleinste $\frac{1}{2}$ Stunde. Bei allen Geburten mußte die Kunsthilfe gebraucht werden, und sind außer Fall VI, wo die Symphysiotomie gemacht wurde, alle 7 anderen Fälle durch die Sectio caesarae transperitonealis cervicalis entbunden worden, wobei bemerkt werden muß, daß Fall V = Exstirpatio uteri unter diese 7 Fälle gerechnet wird. Als einziger Todesfall der Mutter ist dabei Fall V zu erwähnen (Pneumonie).

Verteile ich nun die 8 Fälle auf die vier Jahreszahlen, so kommen auf das Jahr 1931 Fall, 1932 1 Fall, 1933 3 Fälle, 1934 3 Fälle. Diese ungleichmäßige Verteilung erklärt sich aus einem weit höheren Prozentsatz der Röntgenaufnahmen in den letzten anderthalb Jahren gegenüber früher. Speziell der verhältnismäßig hohe Prozentsatz des letzten halben Jahres hat wohl das häufigere Vorkommen des doppelten Promontriums nachgewiesen und Anlaß zu der Arbeit gegeben.

Uebersichts-Tabelle I

Lfd. Nr.	Jahrgang und Krankenblatt	Alter ? para	Verlauf früherer Geburten	Sichtbare Zeichen von Rachitis	Doppelbeg. Promontorium	
1	1931 Nr. 686	21 Jahre I para	Keine	Rachitis der Zähne und Unterschenkel. Rach. Rosenkranz Skoliose	I. Sacral-wirbel	8.
2	1932 Nr. 600	37 Jahre I para	Keine	Keine	„	9.
3	1933 Nr. 87	26 Jahre I para	Keine	Rachit. Rosenkranz	„	8.
4	1933 Nr. 512	25 Jahre I para	Keine	Rachitischer Habitus (Rosenkranz u. Beine)	„	8.
5	1933 Nr. 664	34 Jahre IV para	1921 Lymphysiotomie 1925 Sectio 1928 Spontan	Keine	V Lumbal-wirbel (u. Drittel)	7.
6	1934 Nr. 14	44 Jahre VIII para	6 Spontan 1 Forceps	Keine	I. Sacral-wirbel	9.
7	1934 Nr. 157	32 Jahre II para	1927 Sectio caesrea	Rachitischer Rosenkranz	V. Lumbal-wirbel (u. Drittel)	7.
8	1934 und 1927/28 Nr. 1063	34 Jahre II para	1928 Sectio caesarea	Keine	V. Lumbal-wirbel (u. Drittel)	9.

Conjugata vera	Grad der Beckenverengung	Blasensprung	Kunsthilfe	Ausgang für die Mutter
2cm	2ten Grades	1 Stunde vorher	Sectio caesarea	Gesund entlassen
2cm	1ten Grades	2 Stunden vorher	„	„
1cm	2ten Grades	4 Stunden vorher	„	„
3cm	2ten Grades	Unbekannt	„	„
4cm	3ten Grades	Unbekannt	Laparotomie Exstirpation uberi	Exitus letalis(Bronchopneum.)
4cm	1ten Grades	1/2 Stunde vorher	Lymphysiotomie	Gesund entlassen
1cm	3ten Grades	Unbekannt	Sectio caesarea	Gesund entlassen
2cm	1ten Grades	1928 Unbekannt	1928 Section caesarea	Gesund entlassen

Uebersichts-Tabelle II

Lfd. Nr.	Geschlecht	Länge	Gewicht	Großer querer Kopf-durchm.	Ausgang für das Kind	Bemerkungen
1	männl.	52 cm	4000	9,6 cm	Gesund entlassen	Das rechte Schadelbein über das linke geschoben
2	weibl.	50 cm	3350	9,2 cm	„	Beide Scheitelbeine über Stirnbeine konfiguriert
3	männl.	49 cm	2600	9,1 cm	„	Beide Scheitelbeine über Stirn- und Hinterhauptbein konfiguriert
4	männl.	49 cm	3150	8,3 cm	„	—
5	weibl.	49 cm	3100	8,6 cm	tot geboren	—
6	männl.	50 cm	3160	10,2 cm	Ges. entl.	Rechtes Scheitelbein liegt unter dem linken
7	männl.	49 cm	3200	8,5 cm	„	—
8	männl.	50 cm	3150	9,5 cm	„	—

Zu Tabelle II sei bemerkt, daß von den 8 Kindern 6 Knaben und 2 Mädchen sind. Die größte Länge unter den männlichen beträgt 52 cm, die kleinste 49 cm. Von den weiblichen Kindern ist eines 50 cm, das andere 49 cm lang. Das größte Gewicht beträgt 4000 gr., das kleinste 2600 gr. Der größte quere Kopfdurchmesser ist 10,2 cm, der kleinste 8,3 cm. 4 Fälle = 50% weisen Konfigurationen des Kopfes auf, wozu an dieser Stelle erwähnt sei, daß sämtliche Geburten in Schädellage stattgefunden haben. Von den 8 Kindern kam Fall V tot zur Welt, während die übrigen 7 gesund entlassen werden konnten.

Zum Schlusse der Arbeit ist zu erwähnen, daß bei Befichtigung der Beckensammlung in der hiesigen Frauenklinik sich ebenfalls ein doppeltes Promontorium vorfand. Es handelt sich um ein platt rachitisches Becken mit der Beckennummer 21 und aus dem Jahre 1867 stammend. Der 5. Lumbalwirbel geht in den ersten Sacralwirbel ziemlich scharf über, so daß die Zwischenhandscheibe gleichfalls ein doppeltes Promontorium darstellt. Das Wenige der vorliegenden Krankengeschichte folgt hier kurz:

32jährige mittelgroße Frau, II. para.

Die erste Entbindung soll gut, aber sehr schwer verlaufen sein. Das Kind soll am Schädel einen tiefen Eindruck gehabt haben. Die jetzige, also zweite Entbindung, hat am 10. Juli 1867 stattgefunden. Am 8. Juli = 2 Tage vorher, sei plötzlich Fruchtwasser abgefloßen (vorzeitiger Blasenprung). Die Wehen haben erst am nächsten Tage in der Frühe eingesetzt. Eine vaginale Untersuchung bezeichnet den Kopf als sehr hoch stehend, mit Neigung, nach rechts abzuweichen, in zweiter Schädellage. Am selben Tage habe dann eine zweite vaginale Untersuchung ergeben: Muttermund annähernd verstrichen, Kopf immer noch sehr hochstehend in erster Schädellage und vor ihm eine Hand liegend. Anschließend Wendung auf den Fuß und Extraktion. Der nachfolgende Kopf sei dann nur sehr schwer gefolgt. Das asphyktisch geborene

Kind ist am 13.7. an Pneumonie, die Mutter am 15.7. an Sepsis zugrunde gegangen.

Wichtig ist die Frage, ob das doppelte Promontorium, was an und für sich wahrscheinlich ist, für den Geburtsverlauf bezüglich der Beckenverhältnisse eine Verschlechterung darstellt. Dazu ist hervorzuheben, daß sämtliche der hier behandelten Becken mit doppelten Promontorien operativ behandelt werden mußten; außer der Symphysiotomie mußte in allen Fällen der Kaiserschnitt — obwohl nur zwei Becken 3. Grades vorlagen — gemacht werden. Die Becken 2. Grades = über 8 cm betrug, obschon das Durchschnittsgewicht nur 3200 gr. war, immerhin über 30%. Allerdings waren die queren Kopfdurchmesser zum Teil recht groß = 10,2, 9,6 und zwei mit 9,5 cm. Die Anzahl der beobachteten Fälle ist natürlich zu klein, um ein endgültiges Urteil zu fällen, doch scheint immerhin hervorzugehen, daß dem doppelten Promontorium in Bezug auf Prognose größte Beachtung beizumessen ist.

Geburtsmechanisch muß man sich vorstellen, was aus der Zeichnung hervorgeht, daß es sich nicht um Verengung einer Beckenebene, sondern eines ganzen Raumes handelt, und vor allem bei Durchtritt des Schädels in Naegelischer Obliquität beim Drehen des Kopfes unter Anstemmung an der Symphyse der größte Durchmesser vielleicht das erste Promontorium glücklich überwunden hat, dann aber nur bei vorhandener Ausbuchtung des Kreuzbeines tiefer treten kann. Fehlt diese, so bleibt der Kopf stecken, obwohl die eigentliche Conjugata vera überwunden war.

Literaturangabe.

Bumm: Lehrbuch der Geburtshilfe.

Ahlfeld: Lehrbuch der Geburtshilfe.

v. Winkel: Lehrbuch der Geburtshilfe.

Monatschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 90,
Jahrgang 1392.

Fritsch: Lehrbuch der Geburtshilfe.

Stöckel: Lehrbuch der Geburtshilfe.

Bickenbach: Röntgenologische Messung des Beckens.
(Arch. f. Gynäkol.)

Jaschke, R. Th. v. und Pankow, O.: Lehrbuch der
Geburtshilfe.

Sellheim: Bestimmung des geraden Durchmessers des
Beckeneingangs. (Zbl. f. Gynäkol. 1904.)

Knapp: Geburtshilfliche Propädeutik.

Lebenslauf.

Geboren wurde ich, Albert Josef Sommer, kathol. Konfession als Sohn des verstorbenen prakt. Arztes Dr. med. Josef Sommer und seiner Ehefrau Adelheid geb. Clos am 30. September 1900 zu Anröchte Kr. Lippstadt i. W. Bis zu meinem 11. Lebensjahr besuchte ich die Elementarschule meines Heimatortes. Alsdann besuchte ich die Rektoratschulen in Erwitte und Warstein, die Gymnasien zu Rheine und Beckum. An letzter Anstalt bekam ich Januar 1920 das Maturitätszeugnis. Während des Weltkrieges war ich Soldat im K.I.K. 145. —

Ich widmete mich dem Studium der Medizin und bezog die Universitäten Münster, Kiel und Bonn. Das Physikum bestand ich 1924 in Kiel. Im November 1926 bestand ich in Bonn das medizinische Staatsexamen. Anschließend war ich als Praktikant und Assistent im Dreifaltigkeits-Hospital in Lippstadt tätig. Meine Approbation als Arzt bekam ich ebenfalls im Dezember 1927. Ab 1930 war ich in der Praxis meines Vaters, bestehend aus Allgemeinpraxis mit Geburtshilfe und Krankenhaustätigkeit (mittlere Chirurgie) beschäftigt. Nach dem Tode meines Vaters im März 1933 übernahm ich selbständig die Praxis und Krankenhaustätigkeit.

